

## ALBENDAZOLE

### Oral Suspension

Each 10 ml contains:

Albendazole USP..... 200 mg .

Banana flavored syrupy base .....qs

### Indications:

Albendazole is a broad spectrum anthelmintic for treatment of:

Enterobius vermicularis ----->Pinworm or Threadworm

Trichuris trichiura-----> Whipworm

Ascaris lumbricoides -----> Large roundworm

Ancylostoma duodenale -----> Hookworm

Strongyloidiasis -----> Hookworm

Taenias SPP. -----> Tapeworm

In single or mixed infestation of any of the above.

### Dosage and Administration:

Albendazole should be taken with food to lessen stomach upset.

Under medical prescription .

Adults: 400 mg as a single dose.

Taeniasis infections 400 mg once daily for 3 consecutive days.Strongyloidiasis 400 mg twice daily for 3 days.

If the patient is not cured on follow up after 3 weeks, second course of treatment is indicated.

Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale 400 mg as a single dose (oral suspension 20 ml).

Children: 1-2 years----200 mg as a single dose.

Above 2 years -----same as adults.

### Side effects:

Is generally well tolerated, however adverse effects like nausea, vomiting, epigastric distress,

reversible alopecia has been observed with the use of Albendazol

**Contra-Indications:**

Albendazol is contraindicated in individuals with a known history of hypersensitivity to the drug and in pregnant women.

**Cautions:**

Used with caution in nursing women, avoid using Albendazol in pregnant women or those likely to be pregnant, for women of childbearing age (40-15 years) Albendazol should be administered within 7 days of the start of normal menstruation.

**Drug interactions:**

Drug plasma level of Albendazol may increase with concomitant administration with Dexamethasone, Cimetidine or praziquantel.

**Presentation:**

Suspension in single dose 20 ml bottle.

**Storage Conditions:**

- Keep the medicines out of reach of children.
- Store at room temperature not exceeding 30°C
- Protect from light.

Reg No: 2234

البندازول

معلق فموي

المحتويات:

تحتوي كل ١٠ مللتر على:

البندازول USP ..... ٢٠٠ ملغ .

معلق بنكهة الموز .

الاستعمالات:

البندازول دواء طارد للديدان بانواعها ، وهو يستخدم لعلاج الاصابة بما يلي:

الديدان الدبوسية او الخيطية .

الديدان السوطية .

الديدان الاسطوانية الكبيرة ( الاسكارس ) .

ديدان الانكلستوما ( الخطافية ) الاثنى عشرية .

الديدان الاسطوانية الصغيرة .

الديدان الشريطية .

الجرعة وتعاطي الدواء :

يجب اخذ البندازول مع الطعام لتقليل الاضطرابات المعدية .

يؤخذ البندازول تحت اشراف الطبيب .

الكبار : ٤٠٠ ملغ ( ٢٠ مللتر ) كجرعة واحدة .

الديدان الاسطوانية الصغيرة او الديدان الشريطية، يتعاطى المريض جرعة واحدة مقدارها ٤٠٠ ملغ على مدى ٣ ايام

متتالية .

الديدان الخطافية: يتعاطى المريض ٤٠٠ ملغ مرتان يومياً لمدة ٣ ايام .

في حال عدم شفاء المريض عند بحث حالته بعد ٣ اسابيع. فيكرر العلاج مرة اخرى .

الديدان الدبوسية او الخيطية. الديدان السوطية، الاسكارس ديدان الانكلستوما في الاثنى عشرية تكون الجرعة ٤٠٠ ملغ

فموية واحدة ( ٢٠ مللتر ) .

الاطفال ( ١-٢ سنوات ): ٢٠٠ ملغ كجرعة واحدة .

الاطفال اكثر من ٢ سنة: تكون الجرعة مماثلة لجرعة الكبار .

الآثار الجانبية:

عموماً لا توجد للبندازول آثار جانبية مهمة، مع ذلك وفي بعض الحالات لوحظ وجود غثيان. تقيؤ. اضطرابات معدية

ومعوية، وفي حالات نادرة اعراض سقوط الشعر والذي يختفي بعد مدة من زوال تأثير العلاج.

الامتناع عن تعاطي الدواء:

يجب الامتناع عن تعاطي الدواء في حالات الحساسية المفرطة للمادة الفعالة. وكذلك يجب الامتناع عن تعاطي الدواء من

قبل النساء الحوامل .

الاحتياطات:

يعطى البندازول بحذر في حالة المرأة المرضع. ويمنع استعماله من قبل النساء الحوامل او النساء التي يكون حملهن مرجحاً

اما بالنسبة للاناث في سن الانجاب ( ١٥ - ٤٠ ) سنة فيجب ان يتناولن البندازول في غضون ٧ ايام من بدء الدورة

الشهرية الاعتيادية.

التداخلات الدوائية:

ان مستوى البندازول في البلازما ممكن ان يرتفع عند تعاطي الكساميثازون او السمدين او البرازيكوتال .

العبوة:

معلق فموي كجرعة واحدة، قنينة سعة ٢٠ مللتر .

شروط الحفظ :

- يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال.
- يحفظ في درجة حرارة الغرفة بحيث لا تتعدى 30 م°
- يحفظ بعيداً عن الضوء.

مسجل في وزارة الصحة برقم : 2234