

## Calcium

Calcium carbonate tablet.....500 mg

### Composition:

Each tablet contains:

Calcium carbonate USP... 500 mg

### Indications:

Supplement where a calcium deficiency exists.

### Contra-indication:

Conditions associated with hypercalcaemia, hyperthyroidism, hypercalciuria.

### Cautions:

Renal impairment, sarcoidosis, history of nephrolithiasis. Calcium carbonate should only be used during pregnancy when benefit outweighs risk.

There are no data on the excretion of calcium carbonate into human milk.

Calcium is considered a normal component of human milk.

### Dosage and administration:

Take this medication exactly as prescribed by your doctor, swallow the calcium carbonate tablet with a full glass of water.

Usual adult does for osteoporosis:

2500 to 7500 mg/day orally in 2 to 4 divided doses, with meals.

Usual adult does for hypocalcemia:

900 to 2500 mg/day orally in 2 to 4 divided doses. This does may be adjusted as needed to achieve a normal serum calcium level.

Children over 6 years of age does for hypocalcemia:

112.5 to 162.5 mg/kg/day in 4 divided doses, with meals.

### Side effects:

Gastro- intestinal disturbances, bradycardia, arrhythmias, swelling of face, lips, tongue or throat. Dry mouth.

### Drug interaction:

Calcium salts reduce absorption of tetracycline and ciprofloxacin.

Absorption of calcium salts reduced by corticosteroids. Increased risk of hypercalcaemia when calcium salts reduced by corticosteroids. Increased risk of hypercalcaemia when calcium salts reduced by corticosteroids. Increased risk of hypercalcaemia when calcium salts given with thiazides.

Calcium salts reduce absorption of fluorides, iron, thyroxin and zinc.

Presentation:

Each big box contains 49 small boxes, each box contains 5 sheets, each sheet contains 10 tablets.

Storage Conditions:

- Keep the medicines out of reach of children.
- Store at room temperature not exceeding 30°C
- Protect from light.

Reg No: 2837

## كالمسيوم

أقراص كربونات الكالمسيوم ... 500 ملغ

المكونات:

يحتوي القرص الواحد:

كربونات الكالمسيوم ..... 500 ملغ

الاستعمالات:

يستعمل في حالات نقص الكالمسيوم.

موانع الاستعمال:

فرط الكالمسيوم الدم، فرط نشاط الغدة الدرقية، فرط كالمسيوم البول.

التحذيرات:

يجب الحذر عند تعاطي كربونات الكالمسيوم في حالات الضعف الكلوي، السركوديه (الحمائية)، التحصي الكلوي، يجب استعمال كربونات الكالمسيوم في فترة الحمل اذا كانت الفوائد تفوق المضار، لاتوجد معلومات بما يخص إفرزات كربونات الكالمسيوم في حليب الأم، الكالمسيوم يعتبر من مكونات حليب الأم.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

يؤخذ الدواء حسب إرشادات الطبيب، يؤخذ مع قدح كامل من الماء.

البالغين في حالات تخلخل العظام:

2500-7500 ملغ / يوم ... 2-4 مرات يومياً مع الطعام.

البالغين في حالات نقص الكالمسيوم:

900-2500 ملغ/يوم ... 2-4 مرات يومياً. تعدل الجرعة حسب الحاجة إلى أن يبلغ الكالمسيوم مستواه الطبيعي في الدم.

الأطفال فوق 6 سنوات في حالات نقص الكالمسيوم:

162,5-112,5 ملغ / كغم / يوم ... 4 مرات يومياً مع الطعام.

الأعراض الجانبية:

اضطرابات معوية معدية، أو عدم انتظام دقات القلب، انتفاخ الوجه، الشفاه، اللسان أو الحنجرة، جفاف الفم.

التداخلات الدوائية:

أملاح الكالمسيوم تقلل من امتصاص النترات، السبروفلوكساسين، امصاص أملاح الكالمسيوم يقل بتأثير الستيرويدات القشرية، هنالك خطورة من حدوث فرط في الكالمسيوم الدم إذا تزامن تعاطي أملاح الكالمسيوم يقل بتأثير الثيازيدات، أملاح الكالمسيوم تقلل من امتصاص فلوريد الحديد والثايروكسين والزنك

العبوة :

علبة كبيرة تحتوي على 49 علبة صغيرة وكل علبة صغيرة تحتوي على 5 شريط / كل شريط 10 حبة.

شروط الحفظ :

- يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال.

- يحفظ في درجة حرارة الغرفة بحيث لا تتعدى 30 م

- يحفظ بعيداً عن الضوء.

مسجل في وزارة الصحة برقم : 2837