

Cyprodad

Tablets

Antihistamine

Composition: Each tablet contains: Cyproheptadine Hcl 4mg.

Indications:

- Allergic and itchy conditions of skin such as in urticaria, cold urticarial (usually resistant to other antihistamines) eczema, neurodermatitis, etc.
 - Allergic and vasomotor rhinitis, etc.
 - Allergic conjunctivitis and contact dermatitis of the eye lids.
 - As a prophylactic measure in migraines and cluster headache.
 - As an appetite stimulant.
- Cautions and contra indications:
- Hypersensitivity to Cyproheptadine or similar drugs.
 - Cyproheptadine has a significant antimuscarinic activity and it should therefore be used with caution in prostatic hypertrophy, urinary retention, susceptibility to angle-closure glaucoma, and pyloroduodenal obstruction. Caution may be required in epilepsy. Children and the elderly are more susceptible to side effects.

Hepatic impairment: should be avoided in severe liver disease, increased risk of coma.

Pregnancy and breast feeding: avoid during pregnancy.

The use of Cyproheptadine in the latter part of the third trimester may cause adverse effects in neonates such as irritability, paradoxical excitability, and tremor.

Avoid using nursing mothers.

Side effects: drowsiness, headache, psychomotor impairment, and antimuscarinic effects such as urinary retention, dry mouth, blurred vision, and gastro intestinal disturbances. Other rare side effects are hypotension, palpitation, arrhythmias, extrapyramidal effects, dizziness, confusion, depression, sleep disturbances, tremor, convulsions, hypersensitivity reactions (including bronchospasm, angioedema, and anaphylaxis, rashes, and photosensitivity reactions), blood disorders, liver dysfunction, and angle closure glaucoma.

Drug interactions: increased sedative effect when given with alcohol, opioid analgesics, MAOIs, tricyclics, anxiolytics, hypnotics. Cyproheptadine possibly antagonizes antidepressant effect of SSRIs. Increased risk of antimuscarinic side effects when antihistamines given with antimuscarinics.

Dose :

Cyprodad is better to be given during or after meals.

Anti-allergic, antipruritic

Adults : 4 mg 3-4 times daily, usual range 4-20 mg daily, max. 32 mg daily.

Child: 7-14 years 4 mg 2-3 times daily, max. 16 mg daily

Migraine: 4 mg with a further 4 mg after 30 minutes if necessary, maintenance, 4 mg every 4-6 hours.

Storage Conditions:

- Store at room temperature not exceeding 30°C
- protected from light, keep all medicine away from reach of children

Presentation: box of 20 tablets (2 strips X 10 tablets)

سيبروداد

أقراص

مضاد للهستامين

التركيب: يحتوي كل قرص على :

سايبروهيتادين هيدروكلوريد 4 ملغم

دواعي الاستعمال :

• أمراض الجلد الناشئة عن فرط الحساسية وأمراضه الأخرى المصحوبة بحكة مثل الارتيكاريا , الارتيكاريا التي تنشأ عند التعرض للجو البارد أو الاستحمام بالماء البارد (وتلك غالباً لا تستجيب لمضادات الحساسية الأخرى) , الأكزيما , الأكزيما العصبية , الخ .

• فرط حساسية الأنف والتهاب الأنف الوعائي .

• فرط حساسية ملتزمة العيون والجفون .

• كوقاية في حالات الصداع الوعائي (مثل الصداع النصفي) .

• لفتح الشهية .

نواهي الاستعمال:

• فرط الحساسية للسيبروهيتادين والأدوية المشابهة له .

• يستعمل السيبروداد بحذر في حالة تضخم البروستات , الاحتباس البولي , الجلوكوما ضيقة الزاوية , انسداد البواب

(قم المعدة) , والصرع . الأطفال وكبار السن أكثر عرضة للأعراض الجانبية .

• يجب تجنب استعمال السيبروهيتادين في الحالات الشديدة لأمراض الكبد , بسبب زيادة مخاطر حدوث الغيبوبة .

• يجب تجنب الاستعمال أثناء الحمل , الاستعمال خلال الثلث الأخير للحمل قد يسبب سرعة التهيج , رعشة , في الطفل حديث

الولادة . لا يستعمل السيبروداد خلال فترة الارضاع .

الأعراض الجانبية:

نعاس , صداع , خمول , احتباس البول , جفاف الفم , عدم وضوح الرؤية , اضطرابات معوية .

من الأعراض النادرة الحدوث هبوط ضغط الدم , خفقان , عدم انتظام دقات القلب , دوار , حالات من الارتباك والكآبة وقلق

النوم , رعشة , اختلاج , تفاعلات فرط الحساسية (تشنج شعبي , وذم وعائي , طفح فرط الحساسية , تفاعلات التحسس

للضوء) , اضطراب الدم , نقص في وظائف الكبد , جلوكوما ضيقة الزاوية .

التداخلات الدوائية:

تحدث زيادة في نسب ترسب السيبروهيتادين عند تزامن تعاطيه مع الكحول , المسكنات الأوبويديية , مضادات

الاكتئاب , مضادات القلق , ومضادات الأرق .

السيبروهيتادين مضاد لعمل مثبطات السيروتونين , ويزيد من أعراض مضادات المسكرين عند تعاطيه معها .

الجرعة :

يفضل ان يأخذ سيبروداد اثناء تناول الطعام او بعده .

للحساسية والحكة :

لللكبار : 4 ملغم 3-4 مرات يوميا , بمعدل 4-20 ملغم يوميا , الحد الأقصى 32 ملغم يوميا .

الأطفال : 7-14 سنة 4 ملغم 2-3 مرات يوميا , الحد الأقصى 16 ملغم يوميا .

الشقيقة: 4 ملغم ثم 4 ملغم بعد 30 دقيقة عند الضرورة , بمعدل 4 ملغم كل 4-6 ساعات .

التعبئة :

علبة تحتوي على 20 قرص (2 شريط × 10 قرص)

شروط الحفظ :

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال .

- يحفظ في درجة حرارة الغرفة بحيث لا تتعدى 30 م

- يحفظ بعيداً عن الضوء .