

KETOTIFEN

SYRUP

Composition: Each 5 ml contains :

Ketotifen fumarate equivalent to Ketotifen 1 mg.

Indication:

allergic rhinitis.

caution and contraindication:

Ketotifen has a significant antimuscarinic activity and it should therefore be used with caution in prostatic

hypertrophy, urinary retention, susceptibility to angle-closure glaucoma, and pylorodental obstruction.

caution may be required in epilepsy. children and the elderly are more susceptible to effects.

hepatic impairment:

should be avoided in severe liver disease, increased risk of coma.

pregnancy and breast feeding:

avoid during pregnancy.

the use of ketotifen in the latter part of the third trimester may cause adverse effects in neonates such as irritability, paradoxical excitability, and tremor.

avoid using in mothers who are breast feeding.

side effects:

drowsiness, headache, psychomotor impairment, and antimuscarinic effects such as urinary retention, dry

mouth, blurred vision, gastrointestinal disturbances, excitation, irritability, nervousness, less commonly

cystitis.

other rare side effects are hypotension, palpitation, arrhythmias, extrapyramidal effects, dizziness, confusion, depression, sleep disturbances, tremor, convulsions, hypersensitivity (including

bronchospasm, angioedema, and anaphylaxis, rashes, and photosensitivity reaction), blood disorders, liver

dysfunction, and angle closure glaucoma, weight gain, very rarely Stevens-Johnson syndrome.

drug interactions:

increased sedative effect when given with alcohol, opioid analgesics, MAOIs, tricyclics, anxiolytics, hypnotics.

ketotifen possibly antagonizes antidepressant effect of SSRIs.

increased risk of antimuscarinic side effects when antihistamines given with antimuscarinics.
thrombocyte

count depressed when ketotifen given with metformin (avoid concomitant use).

dose :

1mg twice daily with food increased if necessary to 2mg twice daily, initial treatment in readily sedated

patients 0.5-1 mg at night.

child: 3 years and over 1 mg twice daily.

presentation > 1 bottle with 100 ml.

Storage Conditions:

- Keep the medicines out of reach of children.
- Store at room temperature not exceeding 30°C
- Protect from light.

Reg No: 2837

كيتوتيفين

شراب

المحتويات:

تحتوي كل ملعقة صغيرة (5 مل) على:

كيتوتيفين فيومرات يكافئ كيتوتيفين 1 ملغم .

الاستعمالات:

التهاب الانف الاستهلافي.

نواهي الاستعمال:

يستعمل كيتوتيفين بحذر في حالة تضخم البروستات, الاحتباس البولي, الجلوكوما ضيقة الزاوية, انسداد البواب (فم المعدة), والصرع. الاطفال

والكبار السن عرضة للاعراض الجانبية.

يجب تجنب استعمال كيتوتيفين بحذر في الحالات الشديدة لامراض الكبد بسبب زيادة مخاطر حدوث غيبوبة.

الحمل والارضاع:

يجب تجنب الاستعمال اثناء الحمل الاستعمال خلال الثلث الاخير للحمل قد يسبب سرعة التهيج رعشة الطفل حديث الولادة لا يستعمل كيتوتيفين خلال فترة الارضاع.

الاعراض اجانبية :

نعاس, صداع, خمول, احتباس البول, جفاف الفم , عدم وضوح الرؤية, اضطرابات معوية, استشارة, سرعة التهيج, عصبية, والتهاب المثانة

وهو قليل الحدوث على العموم.

من الاعراض النادرة الحدوث هبوط ضغط الدم, خفقان, عدم انتظام دقات القلب, دوار, حالات من الارتباك والكأبة, وقلق النوم, رعسة, اختلاج,

تفاعلات فرط الحساسية (تشنج شعبي, وذم وعائي, طفح فرط الحساسية, تفاعلات التحسس للضوء) اضطراب الدم, نقص في وظائف الكبد,

جلوكوكا ضيقية الزاوية, وزيادة في الوزن ارعض Stevens-johnson (نادرة جداً)

التداخلات الدوائية:

تحدث زيادة في نسب ترسب كيتوتيفين عند زيادة تعاطيه مع الكحول, المسكنات الاربويدية, مضادات الاكتئاب, مضادات القلق, ومضادات الأرق.

الكيتوتيفين مضاد لعمل مثبطات السيروتونين, ويزيد من الميتفورمين, تجنب تعاطيه معها.

العة 1 ملغم مرتان في اليوم مع الطعام تزداد الى 2 ملغم مرتين في اليوم الجرعة الأولية للمريض السهل التخدير 0.5-1 ملغم ليلاً.

للاطفال (3 سنوات فاكثر):

1 ملغم مرتان في اليوم.

التعبئة:

كل قنينة تحتوي 100 مل.

شروط الحفظ :

- يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال.

- يحفظ في درجة حرارة الغرفة بحيث لا تتعدى 30 م

- يحفظ بعيداً عن الضوء.

مسجل في وزارة الصحة برقم : 2837