

## SOLVODAD

Oral ELIXIR 4mg/ 5ml

Composition: each 5 ml contains 4 mg bromhexine Hcl

Indications: as assistant agent for the liquefaction of the mucous secretions of the respiratory passageway in cases of acute and cronic bronchopulmonary diseases (bronchitis, emphysema, chronic asthmatic bronchitis), during acute exacerbations of bronchitis it must be administered in combination with the appropriate antibiotic.

Contraindications: hypersensitivity to bromhexine.

Warnings and precautions: Patients being treated with bromhexine should be notified of an expected increase in the flow of secretions. The use of bromhexine without medical supervision is not intended in patients who suffer from such condition chronically. Medical advice should be sought if the symptoms last longer than 14 days and/or if the symptoms increase in spite of treatment with bromhexine. Since mucolytics may disrupt the gastric mucosal barrier bromhexine should be used with care in patients with a history of peptic ulcer disease (gastric ulcer). Care is also advisable in asthmatic patients. Clearance of bromhexine or its metabolites may be reduced in patients with severe hepatic or renal impairment. Bromhexine may increase the amount of antibiotic penetration.

Pregnancy and lactation: Must be avoiding during pregnancy and lactation. Side effects: Skin rash, urticarial, nausea, epigastric pain, vomiting, diarrhea, transient elevations in serum aminotransferase levels, dizziness, headache, nocturnal enuresis., anaphylaxis, bronchospasm, difficulty in breathing, angioedema, swelling of the face, lips, mouth, tongue or throat which may cause difficulty swallowing or breathing.

Dosage: Adults and children over 10 years old: 16-8 mg 3 times daily.

Children 10-5 years old: 4 mg 3 times daily.

Children under 5 years old: 2 mg 3 times daily.

General dosage schedule for children: 0.5 mg/kg of body weight per day. The duration of the therapy should not exceed the 10-8 days without medical advice.

Presentation: 1 bottle with 100 ml.

Storage Conditions:

- Keep the medicines out of reach of children.
- Store at room temperature not exceeding 30°C
- Protect from light.

Reg No: 2837

سلفوداد الكسير

التركيب :

كل 5 مل تحتوي على 4 ملغم من البرومهكسين هيدروكلورايد .

الخواص :

اثبتت التجارب الاكلينيكية ان السلفوداد ذو اثر فعال على اذابه المخاط , يعطي تأثيره العلاجي بعد حوالي 30 دقيقه , يظهر مفعوله الكامل خلال يومين او ثلاثه ايام من بدء العلاج عن طريق زياده سيوله سائل الجهاز التنفسي ويصبح المخاط لينا قليل اللزوجه نتيجة تكسير الياف الميوكوبولي سكاريد الحمضيه ويسهل طرده بعملية السعال وتظل درجه سيوله المخاط عاليه بالرغم من تناقص حجمه طوال فتره العلاج بالسلفوداد كما يوجد ايضا استجابته متزايدة للدويه الموسعه للشعب الهوائيه مثل الالوبنت والبيروتيك .  
الاستعمالات :

كل انواع الالتهاب القصيبي الشعبي الامفيزيما المصحوبه بالنزله الشعبيه,الالتهاب الرئوي الحاد ,التهاب الرئه المزمنه ,تمدد الشعب الالتهابي ,النزله الشعبيه المصحوبه بانقباض شعبي يجب استخدام المضاد الحيوي المناسب مع سلفوداد لعلاج النزلات الشعبيه الشديده الحاده , يمكن استخدام السلفوداد ايضا لتسهيل طرد السوائل الغريبه من الشعب الهوائيه

موانع الاستعمال : مطلقا لاستعمال السلفوداد ولكن يجب استعماله بحرص نسبيا عند المرضى بالقرحه المعديه الاعراض الجانبيه :

نادرا ما تحدث اعرض معويه جانبيه . واذا حدثت فانها غالبا تكون بسيطه الاحتياطات :

دلت التجارب التي اجريت على الحيوانات ان السلفوداد ليس له اي تاثير على اجنه الانسان ومع ذلك ينصح بعدم استعماله خلال ثلاثه اشهر الاولى من الحمل كباقي الادويه الاخرى.  
الجرعه وطريقه الاستعمال :

للبالغين والاطفال اكبر من 10 سنوات : 2 ملعقه شاي ثلاث مرات يوميا

للاطفال من 5 الى 10 سنوات : ملعقه شاي 3 مرات يوميا

للاطفال اقل من 5 سنوات : نصف ملعقه شاي 3 مرات يوميا

ويمكن طبقا لمتطلبات العلاج زياده الجرعه او مضاعفتها , والسلفوداد الكسير مناسب جدا لمرضى السكر والاطفال الصغار .

العبوه : زجاجه تحتوي على 100 مل . شروط الحفظ :

- يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال.

- يحفظ في درجة حرارة الغرفة بحيث لا تتعدى 30 م

- يحفظ بعيداً عن الضوء.